Projet Taxon

Inventaires champignons

Découvrez un partie des champignons du campus ! Un rapide aperçu de quelques espèces rencontrées lors des inventaires champignons réalisés de septembre à fin novembre, et encadrés par Didier Le Coeur

+ INFO

Gliophorus psittacinus

Les participants

Cyathus striatus



Hygrocybe conica

Clathrus ruber

Laccaria laccata

Hypholoma fasciculare

Clavulina rugosa

Gymnopilus penetrans

Laccaria amethystina

projet-taxon-information@agrocampus-ouest.fr

Le Projet Taxon

Depuis **deux ans** maintenant les membres du Projet Taxon recensent une partie de la **biodiversité du campus** à l'aide de **protocole scientifiques** élaborés avec les enseignants-chercheurs et d'autres experts.

Toutes les **données** collectées sont **disponibles et libres d'utilisation**. Ces informations permettent ainsi de mesurer l'impact des aménagements du campus (espaces verts) et d'éventuels effets du changement climatique sur la biodiversité.

Si vous avez envie de nous aider ou simplement de passer du bon temps à parfaire vos connaissances naturalistes, **Rejoignez-nous !**

Les participants aux inventaires

25 participants pour 3 inventaires

Initiés ou novices, les participants aux inventaires ont pu découvrir la richesse mycologique du campus et explorer un monde méconnu et riche.

Un total de 41 espèces ont ainsi pu être identifiées sur le campus!

Les localisations ont été spécifiées puis cartographiées et les identifications recensées et validées par Didier Le Coeur

+ INFO

RETOUR


Bionov S.A
Inocybe geophylla
MAAF Assurances
RENNES LAFAYETTE
Raku et Barbotine
EHESP-Co
Scleroderma citrinum
Agaricus xanthodermus
L'Institut Agro
Rennes-Angers
Terralim
Amanite tue-mouche
Cèpe de Bordeaux
Tricholoma saponaceum
Clitocybe nebularis
Foyer
Cuphophyllus virgineus
Gliophorus psittacinus
halieutique
La Reine de Cœur
Rhodocollybia butyracea
Inocybe sp.
Hygrocybe conica
Polypore sp.
Clavulina rugosa
Hebeloma sp.
Laccaria laccata
Mycena diosma
Clavulina rugosa
Cité 3bis
Inocybe geophylla
Marasmius oreades
Panaeolus sp.
Mycena sp.
Gymnopilus penetrans
Mycena sp.
Paralepista flaccida
Hypholoma fasciculare
Laccaria laccata
Hebeloma sp.
Hebeloma sp.
Mycena sp.
Lactarius necator
Hebeloma sp.
Paneolus sp.
Inocybe geophylla
Lepista nuda
Pholiote sp.
Coprinus comatus
Mycena oliyaceomarginata
Bd Marbeu
Rue Lo
Marbeuf
All. de
Danet

Le Projet Taxon

Depuis **deux ans** maintenant les membres du Projet Taxon recensent une partie de la **biodiversité du campus** à l'aide de **protocole siencientifiques** élaborés avec les enseignants-chercheurs et d'autres experts.

Toutes les **données** collectées sont **disponibles et libres d'utilisation**. Ces informations permettent ainsi de mesurer l'impact des aménagement du campus (espaces verts) et d'éventuels effets du changement climatique sur la biodiversité.

Si vous avez envie de nous aider ou simplement de passer du bon temps à parfaire vos connaissances naturalistes, **Rejoignez-nous !**

Sources images:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hygrocybe_psittacina

Gliophorus psittacinus

Hygrophore perroquet

Trouvé le 30/11/2023

Un champignon fort en couleurs et pouvant atteindre 5 cm de haut. Il est relativement peu fréquent. Il a été trouvé en bas du batîment 4. On le trouve généralement dans l'herbe des prés maigres et de pâturages. Il peut donc servir d'indicateur du sol.

+ INFO

RETOUR

ChampYves©2008


Clitocybe nebularis
Cuphophyllus virgineus
Gliophorus psittacinus
Amphithéâtre Matagrin
Salle de spécialisation halieutique
Hygrocybe conica
Hebeloma sp.

Cyathus striatus

Cyathe strié ou Nid d'oiseau

Trouvé le 30/11/2023, à proximité de la cité 3 et de la cité 10.

Petits champignons d'environ 1 cm, se développent sur des sols riches en matière organiques. Ils ont durant la phase de fructification une forme de nid d'oiseau au sein du quel on semble trouver des oeufs! Il s'agit en fait des péridioles, de petits compartiments qui contiennent les spores. Ces sacs seront ensuite dsipersés lorque une goutte d'eau provoquera un effet "splash" sur le champignons!

+ INFO

RETOUR


Cité 3bis
Cyathus striatus
Mycena aetites
laccida
Schizophyllum commune
omarginata

Hygrocybe conica

Hygrophore conique

Trouvé le 30/11/2023, sur la pelouse en bas du bâtiment 4.

L'Hygrophore conique appelé "witch cap" en anglais est un champignon basidiomycète variant du jaune au rouge avec un chapeau assez pointu. On le retrouve dans les prairies, les pelouses et parfois dans les bois. Cette espèce est l'une des plus communes de sa famille. Elle possède un chapeau cireux.

+ INFO

RETOUR

Amphithéâtre Matagrin
Salle de spécialisation halieutique
Hygrocybe conica
Hebeloma sp.

Clavulina rugosa

Clavaire rugueuse

Ces champignons de la classe des agaricomycètes et de la famille des *Clavulinaceae* aussi appelés les "champignons corail" en anglais. La clavaire rugueuse est un petit champignon (3 à 7cm) poussant au ras du sol et souvent auprès de conifères. Ce champignon est mou et élastique au toucher. Il peut être confondu avec *Clavulina cristata qui est un peu plus ramifiée*

+ INFO

RETOUR


Tricholoma saponaceum
UMR SAS 1069
Inocybe sp.
Clavulina rugosa

Gymnopilus penetrans

Flammule pénétrante

Trouvé dans l'arboretum le 30/11/2023

Ce champignon qui mesure entre 1 et 6 cm de haut pousse généralement sur du bois ou des débris de conifères, bien que le retrouve parfois sur les débris de feuillus. C'est un champignon non comestible qu'on peut retrouver entre septembre et janvier.

+ INFO

RETOUR





Source: société mycologique de la cote d'or


Tricholoma saponaceum
UMR SAS 1069
Inocybe sp.
Clavulina rugosa
Inocybe geophylla
Mycena diosma
Gymnopilus penetrans
Marasmius oreades

Laccaria amethystina

Laccaire améthyste

Sur le cheminement dans l'arboretum le 16/11/2023

Ce champignon pousse souvent à proximité des hêtres et en plus d'être une espèce magnifique, le laccaire améthyste est une espèce ubiquiste comestible ! En revanche, comme de nombreux champignons certains composés radioactifs s'accumulent dans ses tissus alors faites attention! Egalement, si vous êtes débutant demander toujours l'avis d'un spécialiste puisque vous pourriez le confondre avec le cortinaire violet, qui lui est dangereux.

+ INFO

RETOUR

Russula parazurea
Rhodocollybia butyracea
Thelephora terrestris
Suillus bovinus
Polypore sp.
Laccaria amesthystina
Tricholoma ustale
Agaricus sylvaticus
Clavulina rugosa
Laccaria laccata
Bolet sp.
Mycena sp.
Panaeolus sp.
Mycena aetites
Mycena sp
Cité Riffaut

Laccaria laccata

Laccaire laqué / Clitocybe laqué

Trouvé le 23/11 et le 30/11/2023

Cette espèce de champignon comestible du phylum des Basidiomycota est commun dans les forêts et lieux découverts. Comme tous les *Laccaria*, il est hygrophane, ce qui veut dire que sa consistance et sa couleur sont très variables selon le temps qu'il a fait. On le trouve souvent en compagnie de son cousin le laccaire amétyste.

+ INFO

RETOUR

Copyright (c) 2006 Jacques Gouraud

Laccaria laccata
Bolet sp.
Mycena sp.
Panaeolus sp.
Mycena aetites
Mycena sp
Cité Riffaut
Hebeloma sp.
Ice Cream
Laccaria laccata


Marasmius oreades
Hypholoma fasciculare
Laccaria laccata
Mycena sp.
Hebeloma sp.

Hypholoma fasiculare

Hypholome en touffe

Trouvé sur le chemin au fond de l'arboretum, le 30/11/2023

Le nom"*fasciculare"* de ce champignon dérive du latin *fasces* signifiant "faisceau". Cela fait référence à ces touffes d'individus soudés entre eux par le pied. Il est recommandé la plus grande prudence avec les champignons en touffe et celui-ci ne déroge pas à la règle : l'hypholome est amer et contient des toxines pouvant causer des syndromes gastro-intestinaux...

+ INFO

RETOUR

Marasmius oreades
Hypholoma fasciculare
Laccaria laccata
Mycena sp.
Hebeloma sp.

Crédits photo : D. Schott, Anonyme

Clathrus ruber

Clathre rouge, coeur de sorcière ou lanterne du diable

Trouvé hors inventaire le 05/05/2023

Espèce de champignons agaricomycètes de la famille des Phallaceae. Le clathre rouge apparaît d'abord sous la forme d'un oeuf, qui éclot pour laisser sortir le réceptacle.
Du fait de son apparence, et de sa forte odeur destinée à attirer les mouches, le clathre a eu une très mauvaise réputation par le passé, considéré comme l'outil des sorcières.

+ INFO

RETOUR